

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 14-3-64 295983

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION D'ORLÉANS (Tél. 87-45-41)

(CHER, INDRE, LOIRET, LOIR-ET-CHER, NIÈVRE, YONNE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 21, rue Eugène-Vignat - ORLÉANS.
C. C. P. : ORLÉANS 4.604-25

ABONNEMENT ANNUEL

15 Francs

Supplément n° 1 au Bulletin n° 42 de Mars 1964

13 MARS 1964

- 3 -

INFORMATIONS

CULTURES OLEAGINEUSES

CHARANCON DES TIGES DE COLZAS

La période froide que nous venons de traverser a empêché toute activité des quelques adultes qui étaient présents dans certaines cultures à la fin du mois de Février.

Le réchauffement qui débute doit augmenter rapidement le nombre de ces adultes et permettre les piqûres nutritives et les pontes.

En conséquence, dans toutes les régions où l'on redoute l'activité de ce ravageur, il est conseillé d'effectuer un traitement en utilisant un des produits conseillés dans la liste qui a été remise à chaque abonné.

ARBRES FRUITIERS

TEIGNE DES FLEURS DE CERISIER

La Teigne des fleurs de cerisier fait des dégâts dans de nombreux vergers, notamment dans le département de l'Yonne et dans la vallée de la Loire.

Ce ravageur passe l'hiver sous forme d'oeufs déposés dans les replis des écorces. Les chenilles qui éclosent très tôt au printemps pénètrent dans les fleurs et dévorent les étamines et le pistil.

Les traitements les plus efficaces sont ceux qui sont effectués avec des colorants ou des huiles jaunes au moment où la majorité des bourgeons se situe entre les stades B et C, C étant l'extrême limite (voir le tableau des stades repères du cerisier qui a été envoyé à chaque abonné).

On peut encore traiter contre la Teigne des fleurs de cerisier en utilisant un Oléoparathion au moment où les bourgeons sont entre les stades C et D.

L'efficacité du traitement dépend beaucoup du soin apporté dans son exécution. La pulvérisation doit être abondante et atteindre toutes les extrémités.

P.../...7

CLOQUE DU PECHER

Cette maladie fait tous les ans des dégâts plus ou moins importants.

Un traitement effectué au débourrement, au gonflement des bourgeons avec un des produits mentionnés dans la liste qui a été remise à chaque abonné, permet de combattre la Cloque du Pêcher.

CORYNEUM - GNOMONIA - MONILIA

Ces maladies sont fréquentes sur les cerisiers. Un traitement effectué au débourrement (stades B - C) avec un produit à base de cuivre donne de bons résultats.

Dans tous les vergers où l'on doit combattre également la Teigne des fleurs de cerisier, l'adjonction d'un produit cuprique aux huiles jaunes, aux colorants ou aux oléoparathions permettra d'effectuer un seul traitement.

TRAITEMENT D'HIVER DE LA VIGNE

Nous rappelons qu'un traitement d'hiver est indispensable dans tous les vignobles où l'on a observé des manifestations de l'Esca ou de l'Excoriose.

Il est nécessaire de suivre toutes les indications données dans le Bulletin Technique n° 41 de Février 1964.

Les Contrôleurs chargés des Avertissements
Agricoles,
G. RIBAUT.
B. PACQUETEAU.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux,
G. BENAS.